

Медикаментозный аборт

1. Что такое медикаментозный аборт?

Медикаментозный аборт это нехирургический метод прерывания нежелательной беременности, рекомендованный Всемирной Организацией Здравоохранения как эффективный и безопасный метод. Этим методом пользуются женщины из развитых стран Европы на протяжении более 10 лет, Он признан в 33 странах мира (Франция, Германия, США, Украина, Россия, Молдова, Китай, Индия и т.д.).

2. Насколько эффективен медикаментозный аборт?

Эффективность метода составляет в среднем 95-98% и зависит от правильной схемы приема препаратов и срока беременности.

3. Как действует медикаментозный аборт?

Данный метод состоит из двух этапов: на первом этапе принимается препарат, который препятствует развитию плодного яйца, на втором этапе – препарат, вызывающий сокращение матки и самостоятельное удаление плодного яйца.

4. Какая схема приема препаратов для медикаментозного аборта?

В 1-ый день на приеме у врача принимается первый препарат, через 1-3 дня необходимо принять второй препарат (на приеме у врача или в домашних условиях). Через 2 недели необходимо прийти к врачу, для того, что бы он смог оценить состояние женщины и отсутствие у нее беременности.

5. Какие симптомы можно ожидать после приема препаратов для медикаментозного аборта?

Схваткообразные боли внизу живота, которые можно уменьшить в результате приема противовоспалительных препаратов (парацетомол, диклофенак, кетанов и др.).

- Выделение плодного яйца, которое сопровождается более сильным кровотечением.
- Кровотечение от умеренного до незначительных кровянистых выделений на протяжении 1-3 недель или вплоть до следующей менструации.

6. Какие побочные симптомы можно ожидать?

В некоторых случаях возможны тошнота, рвота, головные боли, головокружение, диарея, слабость, повышение температуры, озноб – вышеперечисленные симптомы характеризуются короткой продолжительностью.

7. Какие могут быть осложнения?

В редких случаях могут быть осложнения в виде продолжающейся беременности, неполного аборта, обильного кровотечения.

8. Что необходимо делать в случае продолжающейся беременности или неполного аборта?

При продолжении беременности женщине будет предложена вакуумная аспирация. В случае неполного аборта будет предложена дополнительная доза препарата или выполняется вакуумная аспирация.

9. Преимущества медикаментозного аборта:

- Отсутствие хирургического вмешательства и анестезии;
- Более низкий риск инфекционных осложнений по сравнению с хирургическим абортом;
- Более «натуральный» метод прерывания беременности;
- Конфиденциальный и удобный в использовании метод.

10. Кто не может использовать медикаментозный аборт для прерывания беременности?

Женщины:

- с подозрением или наличием внематочной беременности;
- с наличием внутриматочной спирали (предварительно необходимо удалить спираль);
- с надпочечниковой недостаточностью;
- с коагулопатиями или использующие антикоагулянты;
- принимающие стероидные препараты;
- с аллергической реакцией к препаратам;
- со сроком беременности более 9 недель.

11. Через какое время после медикаментозного аборта женщина может вновь забеременеть и когда у нее будет нормальный менструальный цикл?

- Медикаментозный аборт не оказывает отрицательного влияния ни на способность женщины беременеть, ни на ее здоровье в целом.
- Женщина сможет забеременеть уже через 10-11 дней после аборта, поэтому желательно выбрать метод контрацепции во время первого визита к врачу. После аборта менструация наступит как обычно, или 2 недели спустя.

12. Может ли повторное использование данного метода оказать неблагоприятное воздействие?

Согласно исследованиям, повторное использование медикаментозного аборта не оказывает неблагоприятное воздействие ни на физическое, ни на психологическое здоровье женщины.