

## МОДУЛЬ 4:

Подтверждение беременности  
и определение ее срока

Отбор пациенток

и клинико-лабораторное  
обследование


# Подтверждение беременности и определение ее срока

- Основные принципы
  - Важность точного определения срока беременности
    - Позволяет избежать хирургического вмешательства при отсутствии беременности.
    - Если срок беременности превышает 12 недель, необходимо прибегнуть к другой процедуре, а не к МВА.
    - Ошибки в оценке срока беременности являются важной причиной осложнений абортов.

# Методы аборта

Figure 2.1 **Methods of abortion**

Completed weeks since last menstrual period



# Подтверждение беременности и определение ее срока

- Основные принципы
  - Возможные неблагоприятные последствия занижения срока беременности
    - Увеличение продолжительности процедуры; более интенсивное кровотечение; выше риск развития инфекции.
    - Выше риск травмирования шейки матки.
    - Выше риск перфорации матки и повреждения тазовых органов.
    - Увеличение риска анестезиологических осложнений, если потребуется прибегнуть к общему обезболиванию не подготовленной к этому пациентки.
    - Пациентка подвергается риску хирургического вмешательства.
    - Подвергаются риску взаимоотношения пациентки и медицинского персонала, доверие к персоналу и его уверенность в себе.
    - Возрастают финансовые затраты.

# Подтверждение беременности и определение ее срока

- Основные принципы
  - Предупреждение ошибок при определении срока беременности
    - Используйте несколько способов определения срока беременности:
      - Анамнез
      - Объективное исследование
      - Диагностическое ультразвуковое исследование
    - Если больший, чем предполагалось, срок беременности определен уже во время процедуры, примените другой, соответствующий сроку беременности метод проведения аборта *только* при условии, что вы имеете опыт подобных вмешательств.

# Подтверждение беременности и определение ее срока

- Данные объективного исследования
  - Возможные причины того, что размер матки меньше предполагаемого срока беременности
    - Пациентка не беременна
    - Неверная информация о дате последней менструации
    - Эктопическая беременность
    - Аномальная маточная беременность
    - Трофобластическая болезнь
    - Ошибка при проведении обследования

# Подтверждение беременности и определение ее срока

- Данные объективного обследования
  - Возможные причины того, что размер матки больше предполагаемого срока беременности
    - Неверная информация о дате последней менструации
    - Вариант нормы (особенно для многоплодных)
    - Многоплодная беременность
    - Анатомический дефект матки
    - Трофобластическая болезнь
    - Ошибка при проведении обследования

# Отбор пациенток и клинико-лабораторное обследование

- Лабораторные исследования
  - Тесты на подтверждение беременности
    - Тест на беременность
    - Определение уровня  $\beta$ -ХГЧ в сыворотке крови
  - Гемоглобин ???
  - Скрининговые тесты на гонорею и хламидии
  - Другие тесты (согласно принятым в клинике протоколам) ???
  - Определение резус-фактора и изоиммунизация



# Подтверждение беременности и определение ее срока

- Ультразвуковое исследование
- Транс-вагинальное или транс-абдоминальное УЗИ

# Соматические заболевания

- Анемия
- Диабет
- Астма
- Заболевания ССС
- Коагулопатия, антикоагулянтная терапия
- Алкоголизм, наркомания,
- Судороги

# Специфические медицинские ситуации

- Стеноз шейки
- Фиброматоз
- Пороки развития матки
- Шеечная беременность
- ВМС
- Дисплазия
- Признаки инфекций

# Специфические медицинские ситуации

- Клинические признаки инфекции половых путей
  - Начать антибактериальную терапию и провести аборт
  - Или
  - Провести терапию и отсрочить аборт ?

Профилактическое рутинное назначение  
антибиотиков- снижает на 30-50% риск  
инфекций

- Доксациклин 200 мг до процедуры
- Или
- Metronidazol 1 g пер ос , до процедуры, затем 500 mg пер ос каждые 6 часов до трех доз.
- Или
- В зонах с распространенным хламидиозом
- 100 мг Доксациклина 2 раза в день 7 дней